



Rotengle

Espèce proche du gardon, elle est souvent confondue avec ce dernier, le rotengle est l'un des rares cyprinidés qui peuple la zone supérieure des plans d'eau et peut se prendre à l'aide d'une mouche délicatement posée à la surface de l'eau. Néanmoins, le rotengle est surtout recherché par les pêcheurs au coup et est souvent utilisé comme vif pour la pêche des carnassiers.

Nom commun

Gardon rouge, gardon carpe, suce-roseaux, rossard, rousse, louzou, plate, Rotfeder (allemand), Rudd (anglais)

Nom scientifique

Scardinius erythrophthalmus - Découvert par Linné 1758

Famille

Cyprinidés

Le saviez-vous ?

Le rotengle peut s'hybrider avec la brème commune, la brème bordelaise, l'ablette et surtout le gardon et donner naissance à des individus féconds présentant des caractères intermédiaires entre les espèces croisées.

Description

Le rotengle est un poisson au corps ovale et comprimé qui se distingue du gardon par un corps haut doté d'un dos bombé. La bouche est supère sans barbillon.

La nageoire dorsale est implantée en arrière de l'aplomb des nageoires pelviennes (la dorsale est placée à l'aplomb de ces dernières chez le gardon). Les nageoires sont rouges à l'exception de la dorsale.

Généralement de 20 à 30 cm pour un poids de 300 / 400 grammes à l'âge de 10 ans (parfois jusqu'à 50 cm pour un poids de 1,5 kg).

Habitat et comportement

Le rotengle affectionne les eaux lenticules et riches en végétation : étangs, lacs, mares, zones calmes du cours inférieur des cours d'eau, bras mort...

Ce poisson est omnivore à tendance insectivore qui prélève ses proies davantage en surface que le gardon : larves d'insectes, mollusques, crustacés, macrophytes et phytoplancton.

Les adultes sont matures dans leur 2ème ou 3ème année.

Sous nos latitudes, cette espèce peut se reproduire d'avril à juin c'est-à-dire plus tardivement que le gardon. La température de fraie oscille normalement entre 18 et 27°C.

La fécondité est de l'ordre de 300 000 œufs adhésifs par kg de poids vif. La ponte est déposée sur les végétaux en eau peu profonde. La larve est fixée au végétaux jusqu'à résorption de la vésicule vitelline à l'instar du brochet ou de la tanche. Les valeurs moyennes de croissance sont de 3 g pour 50 mm à 1 an, 30 g pour 150 mm à 3 ans et 160 g pour 220 mm à 5 ans.

Pêche et réglementation

Le Rotengle ne bénéficie d'aucune protection réglementaire particulière (pas de taille de capture, pas de quota de capture...). On le pêchera à l'asticot, au ver de vase, au blé ou encore au chènevis de la même façon que pour pêcher le gardon.

Présence en Côte D'or

Cette espèce se rencontre un peu partout dans le département au gré des milieux favorables (canaux, réservoirs, sablières, Saône et plans d'eau). Parfois très abondant dans les milieux stagnants de petite dimension (mares, micro-étangs forestiers, bras mort,...).