



Black-Bass

Cette espèce originaire d'Amérique du Nord est prisée des pêcheurs sportifs. L'abondance du Black-bass dans les eaux côtières demeure souvent faible en dépit de fréquents repeuplements.

Nom commun

Achigan, perche noire, perche d'Amérique, Largemouth bass (anglais), Forellenbarsch (allemand)

Nom scientifique

Micropterus salmoides - Découvert par Lacépède en 1802

Famille

Centrarchidés

Le saviez-vous ?

Il existe une deuxième espèce du genre *Micropterus*, le black-bass à petite bouche *M. dolomieu* qui se distingue de celle qui nous intéresse par la mâchoire supérieure n'atteignant pas le bord postérieur de l'œil à l'arrière.

Description

Le black-bass possède un corps trapu et allongé, une tête forte portant une bouche large et

oblique, et un gros œil. Sa robe est vert bronze avec des flancs plus clairs parsemés de larges tâches noires irrégulières et un ventre blanc.

La croissance est rapide, il atteint normalement 12-15 cm à l'automne (en conditions optimales, il peut passer de 4 g à 600 g en 8 mois !). Sa taille dépasse rarement 50cm et son poids 3,6 kg. La longévité moyenne connue est de 15 ans.

Habitat et comportement

Le black-bass est une espèce nettement thermophile qui occupe des milieux productifs riches en végétation. Il affectionne donc les étangs, canaux, lacs, réservoirs, cours d'eau lents et autres annexes fluviales.

C'est un poisson carnassier opportuniste, diurne, qui prélève insectes, poissons, et crustacés.

La première maturité sexuelle est atteinte vers 3 ans (200-320 mm).

Cette espèce fraie en mai/juin lorsque la température de l'eau se situe entre 15 et 25°C. Un nid est aménagé par le mâle en eau peu profonde sur des graviers ou des sables non colmatés. La ponte est de 5 000 à 10 000 œufs par kg de femelle. L'éclosion intervient en 3-4 jours dans une eau à 20°C. Le mâle assure la garde du nid puis des alevins pendant quelques semaines.

Présence en Côte-d'Or

Cette espèce est présente en Saône, dans le canal de Bourgogne autour et en aval de l'agglomération Dijonnaise, et sur quelques plans d'eau de la plaine Dijonnaise (Bressey, Arc sur Tille) où l'acclimatation n'est toutefois pas acquise.