



# Barbeau Fluvial

Ce poisson a donné son nom à l'une des quatre zones définies par Huet pour décrire les cours d'eau en fonction des espèces piscicoles représentatives. La zone des barbeaux correspond ainsi aux cours d'eau de plaine à courant moyen et aux eaux tempérées (12 à 20°C).

## Nom commun

Barbeau commun, barbet, barbillon, barbu, coquillons, drenek...

## Nom Scientifique

*Barbus barbus* - Découvert par Linné en 1758

## Famille

Cyprinidés

## Le Saviez-Vous ?

En France il existe une autre espèce du genre *Barbus*, le barbeau méridional *Barbus meridionalis* dont la répartition géographique se limite au sud de la France et au nord-est de l'Espagne.

## Description

Poisson dont la morphologie traduit une parfaite adaptation aux zones courantes : corps fusiforme avec une bouche très infère et un museau en pointe dépassant largement la bouche, une nageoire dorsale forte de forme triangulaire et consolidée par un rayon ossifié dans sa partie antérieure. Ce beau cyprin des eaux vives présente une coloration uniforme à

dominante grise ou dorée selon les populations. Les écailles sont petites. La bouche est bordée de lèvres charnues ornées de 2 paires de barbillons. Sa taille atteint 50 cm pour un poids de 1,5 kg. Les femelles sont plus grandes que les mâles.

## Habitat Et Comportement

Le Barbeau occupe les zones moyennes des rivières (zone des Barbeaux) et préfère les eaux vives sur des fonds pierreux ou sableux. Il est grégaire et forme de petites bandes de quelques dizaines d'individus.

Le barbeau est classé parmi les omnivores, se nourrissant de larves de diptères, de débris végétaux, de crustacés, de vers et autres animalcules vivant parmi les fonds.

Cette espèce fraie au printemps (avril-juillet) dans des secteurs bien précis où s'attourent des contingents de géniteurs ayant parfois parcourus de grandes distances pour gagner les zones de fraie. La reproduction est précédée d'une parade nuptiale au cours de laquelle mâles et femelles nagent par paire avant que les œufs soient déposés au sein même du substrat. De couleur jaunâtre, ils sont au nombre de 3 000 à 9 000 et mesurent 2mm. La maturité sexuelle est atteinte vers 4-5 ans.

En période hivernale, le barbeau entre dans une sorte d'hibernation et se concentre en petits groupes dans des zones calmes et profondes.

## Pêche Et Règlementation

Le Barbeau ne bénéficie d'aucune protection réglementaire particulière (pas de quota ou de taille de capture...) mais figure à l'annexe V de la Directive Habitats Faune Flore.

Poisson intéressant pour la pêche sportive en raison de sa combativité, on le pêchera dans les zones courantes avec des lignes eschées de vers de terre ou de gruyère.

## Présence En Côte-D'Or

De belles populations occupent les parties moyennes des affluents rive droite de la Saône (Vingeanne, Tille, Ouche, Vouge). Pour le versant Seine, le Serein, la Seine ou l'Ource hébergent de belles populations où des spécimens d'une cinquantaine de centimètres sont observables.